



“RELACIÓN ENTRE LA SEVERIDAD DE LA VESTIBULOPATÍA BILATERAL, LA POSTUROGRAFÍA DINÁMICA Y LA CALIDAD DE VIDA”

Autores: Dra Susana Hanako Olivero Acevedo, Dra Marla Roxana Trujillo Bracamontes, Dra María del Consuelo Martínez Wbando

Introducción

La vestibulopatía bilateral se ha relacionado con una importante percepción de discapacidad y a un patrón vestibular con límites de estabilidad reducidos en la posturografía dinámica computarizada.

No se cuentan con estudios que relacionen los diferentes grados de severidad de esta patología con calidad de vida.

Palabras clave: Vestibulopatía bilateral, severidad, posturografía, calidad vida.

Objetivos

Describir y asociar la posturografía dinámica y calidad de vida en sujetos con diferentes grados de severidad de vestibulopatía bilateral.

MATERIALES Y METODOS

Diseño

Estudio observacional, descriptivo, transversal, comparativo no experimental.

Muestra

44 pacientes con Vestibulopatía bilateral confirmada

Metodología


- Se clasificaron en tres grados de severidad mediante pruebas térmicas:
Grupo I (G1): parcial moderada,
Grupo II (G2): parcial grave
Grupo III (G3): completa.
- Se aplicó Cuestionario WHOQOL-BREF, Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), Dizziness Handicap Inventory (DHI) y Posturografía Dinámica (PDC).
- Análisis mediante estadística descriptiva: tendencia central y dispersión (variables cuantitativas), frecuencias y porcentajes (cualitativas); asociaciones evaluadas mediante: pruebas de Shapiro Wilk, Levene y ANOVA

Resultados

Variable / Instrumento	Grupo 1 (G1)	Grupo 2 (G2)	Grupo 3 (G3)
WHOQOL-BREF (Calidad de vida)	Buena / Regular	25% Regular / 25% Muy mala	25% Regular / 25% Muy mala
DHI (Discapacidad percibida)	Leve	Moderada	Grave
HADS (Ansiedad y depresión)	Mayoría con	ansiedad 50% y depresión	
PDC (Posturografía Dinámica Computarizada)	Predominio de	aferencia sensorial vestibular + visual	

Grupo I (G1): parcial moderada, grupo II (G2): parcial grave y grupo III (G3): completa. Fuente: Elaboración propia, a partir del proyecto de tesis (2025).

Resultados



Fuente: Elaboración propia, a partir del proyecto de tesis (2025).

Discusión

La vestibulopatía bilateral impacta en dominio ambiente de WHOQOL-BREF

independientemente del grado de severidad más que las alteraciones en PDC a diferencia en reportado en estudios previos.

Conclusión

La vestibulopatía bilateral impacta en dominio ambiente de WHOQOL-BREF

independientemente del grado de severidad más que las alteraciones en PDC a diferencia en reportado en estudios previos.

Referencia bibliográfica

& Olivero Acevedo, S. H., Trujillo Bracamontes, M. R., Martínez Wbando, M. C., (2025). “Diferencias y asociación entre la posturografía dinámica y calidad de vida en sujetos con diferentes grados de severidad de vestibulopatía bilateral.” Proyecto de tesis, Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Ciudad de México